

成分索引

成分索引 I (洋薬)

<p>アクリノール ☞アクリノール水和物</p> <p>アクリノール水和物 【内服】 (腸内殺菌剤) アクロミンカプセルA……………183 エクトール……………183 エクトール赤玉……………183 新オルマイト錠……………183 テリオミンカプセル……………185 トメダインコーワ錠……………185 【外用】 (殺菌消毒剤) ケンエー・アクリガーゼ (部外品)……………727 ケンエーアクリノール液P (部外品)……………727 コーフルS……………409 タマガワ新リバガーゼA……………359 橙色ペークミン……………413 リバガーゼF (部外品)……………727</p> <p>アシクロビル 【外用】 (口唇ヘルペス [再発] 治療剤) アクチビア軟膏……………461 ヘルペシアクリーム……………461</p> <p>アシタザノラスト水和物 【外用】 アイフリーコーワAL……………267</p> <p>アシドフィルス菌 ☞ラクトミン</p> <p>アスコルビン酸 ☞ビタミンC</p> <p>アスコルビン酸カルシウム ☞ビタミンC</p> <p>アスコルビン酸ナトリウム ☞ビタミンC</p> <p>L-アスパラギン酸カリウム ☞アスパラギン酸カリウム</p> <p>アスパラギン酸カリウム 【内服】 (代謝改善剤) アスバラMAX (部外品)……………739 アスバラドリンク α (部外品)……………739 アスバラメガ……………492 新ローヤルゼロントB……………521 新ローヤルゼロントBフレッシュ……………521 【外用】 (代謝改善剤) アイビットV……………245</p>	<p>アイラート40……………246 アイリスネオ〈クール〉……………247 アイリスネオ〈ソフト〉……………247 アスバラ目薬Lプラス……………248 アスバラ目薬クールICプラス……………248 アルガード目すっきり洗眼薬 α……………278 眼涼潤……………272 こどもアイリス……………249 サンテFX Vプラス……………251 サンテFXネオ……………251 サンテドライケア……………273 サンテメディカル10……………252 (薬類)新サントドゥ……………253 新サントドゥ α……………253 新V・ロート……………253 スマイル40EX……………254 スマイル40EX クール……………254 スマイル40EXゴールド……………254 スマイル40EXゴールドマイルド……………254 スマイル40EXマイルド……………254 スマイル40プレミアム……………255 スマイルA……………255 スマイルアミノウォッシュ……………278 スマイルコンタクトEX AL-Wクール……………255 スマイルコンタクトEX AL-Wマイルド……………256 スマイルコンタクトクールブラック……………256 スマイルコンタクトクールフレッシュ……………273 スマイルコンタクトピュア……………273 スマイルコンタクトファインフィット (部外品)……………741 スマイルコンタクトファインフィットプラス……………277 スマイルビットドライアイ……………274 ノアール12EX……………257 ノアールUV……………257 ノアールアイウォッシュS……………278 ノアールクール……………258 ノアール小児用……………258 ファーストマイティアCL-B……………275 V・ロート……………260 V・ロートクール……………260 ホワイトアイリスフレッシュ……………261 マイティア美瞳……………261 マイティアフレッシュ40……………262 ロートCキューブアミノモイスト……………278 ロートCキューブクールモイスト……………279 ロートUVキューア……………263 ロートV7洗眼薬……………279 ロートV11……………263 ロートV11マイルド……………263 ロートアイストレッチ……………263 ロートアルガードこどもクリア……………264</p>	<p>ロートクール40 α……………265 ロートこどもソフト……………265 ロートゴールド40……………265 ロートゴールド40マイルド……………265 ロートジーb……………265 ロートジープロc……………265 ロートデジアイ……………266 ロートビタ40 α……………266 ロートビタフラッシュ……………279 ロートフラッシュ……………279 ロートフラッシュクール……………279 ロート養潤水 α……………267 ロートリセa……………267 ロートリセb……………267 ロートリセ洗眼薬……………279</p> <p>L-アスパラギン酸ナトリウム ☞アスパラギン酸ナトリウム</p> <p>アスパラギン酸ナトリウム 【内服】 (代謝改善剤) アリナミン7 (部外品)……………729 アリナミンV (部外品)……………729 アリナミンV&V NEW (部外品)……………729 アリナミンV&Vロイヤル (部外品)……………729 アリナミンゼロ7 (部外品)……………730 ハイシーバランス (部外品)……………735 ホルユニーアミノD……………533 ユニーD2000……………535 ユニードリンク1500……………535</p> <p>L-アスパラギン酸マグネシウム ☞アスパラギン酸マグネシウム</p> <p>アスパラギン酸マグネシウム 【内服】 (代謝改善剤) アスバラMAX (部外品)……………739 アスバラドリンク α (部外品)……………739 アスバラメガ……………492 アニマリンM……………515 アルフェM1アルフェミニ (部外品)……………730 アルフェ エフィーアップ……………515 アルフェネオ (部外品)……………730 新ローヤルゼロントB……………521 新ローヤルゼロントBフレッシュ……………521 リポビタンJr……………539 【外用】 アスバラ目薬クールICプラス……………248</p> <p>アスパラギン酸マグネシウム・カリウム 【内服】 (代謝改善剤) キュービーコーワプラス……………493 コリホンゴールド内服液……………494</p>
--	---	--

解熱鎮痛薬

アンメルシン鎮痛錠 (小林製薬)

ひざなどの痛みを素早く鎮める内服薬

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 1日量(6錠)中:

イブプロフェン……………450mg

添加物 塩酸グルコサミン, コンドロイチン硫酸エステルNa, ヒドロキシプロピルセルロース, セルロース, トウモロコシデンプン, 乳糖水和物, クロスCMC-Na, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, 酸化チタン, マクロゴール, 三二酸化鉄, カルナウバロウ

効能 関節痛・腰痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製品特有の注意 15才未満は服用しない

製剤 淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 1,000円

その他 製造販売 明治薬品

イブ

(エスエス製薬)

痛み・熱
(イブプロフェン製剤)

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中:

イブプロフェン……………150mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン

効能 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色〜微帯黄白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 580円・36錠 850円

イブA錠

(エスエス製薬)

痛み・熱
(イブプロフェン配合製剤)

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中:

イブプロフェン……………150mg

アリルイソプロピルアセチル尿素…60mg

無水カフェイン……………80mg

添加物 クロスカルメロースNa, 無水ケイ酸, セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン

効能 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 750円・36錠 1,100円・48錠 1,300円・60錠 1,600円

イブA錠EX

(エスエス製薬)

イブプロフェン200mgの配合剤

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中:

イブプロフェン……………200mg

アリルイソプロピルアセチル尿素…60mg

無水カフェイン……………80mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, クロスカルメロースNa, ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体, タルク, ステアリン酸Mg, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, 酸化チタン

効能 月経痛(生理痛)・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を, 1日2回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は6時間以上おくこと

製剤 白色〜帯黄白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 20錠 598円・40錠 980円

その他 2014年10月1日発売

(製品写真003頁)

イブクイック頭痛薬

(エスエス製薬)

痛みにも早く効く(イブプロフェン配合製剤)

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中:

イブプロフェン……………150mg

酸化マグネシウム……………100mg

アリルイソプロピルアセチル尿素…60mg

無水カフェイン……………80mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン

効能 頭痛・肩こり痛・歯痛・月経痛(生理痛)・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 20錠 1,200円・40錠 1,900円

イントウェル

(小林製薬)

つらいのどの痛みにも速く効く
内服カプセル

区分 指定第2類医薬品

成分 カ 1日量(9カプセル)中:

イブプロフェン……………450mg

トラネキサム酸……………420mg

乾燥水酸化アルミニウムゲル…208.5mg

添加物 中鎖脂肪酸トリグリセリド, グリセリン脂肪酸エステル, ポリソルベート80, マクロゴール, ゼラチン, コハク化ゼラチン, グリセリン, パラベン, 酸化チタン

効能 咽喉痛・頭痛・耳痛・神経痛・歯痛・抜歯後の疼痛・関節痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回3カプセル, 1日3回を限度とし, なるべく空腹時を避けて服用。服用間隔は4時間以上おく

製剤 白色のソフトカプセル

包装・価格 18カプセル 1,000円

エキセドリンA錠 (ライオン)

3つの成分を配合した非ピリン系製剤

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中：

アセチルサリチル酸……………500mg
アセトアミノフェン……………300mg
無水カフェイン……………120mg

添加物 トウモロコシデンプン、CMC、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

効能 頭痛、月経痛(生理痛)、歯痛、咽喉痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、抜歯後の疼痛、関節痛、神経痛、ねんざ痛、骨折痛、外傷痛、耳痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。又、服用間隔は6時間以上おくこと

製剤 白色のコーティング錠

包装・価格 20錠 860円・40錠 1,440円・60錠 1,950円

エキセドリンLOX (ライオン)

腰痛・肩の痛み・頭痛に速く効く

区分 第1類医薬品

成分 錠 1錠中：

ロキソプロフェンナトリウム水和物…68.1mg

添加物 乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、三酸化鉄

効能 腰痛・肩こり痛・頭痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・骨折痛・ねんざ痛・打撲痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 症状があらわれた時、成人(15才以上)1回1錠、1日2回まで、ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。なるべく空腹時をさけて服用し、服用間隔は4時間以上あける。水又はぬるま湯にて服用する

製剤 うすい紅色の錠剤

包装・価格 12錠 648円

その他 2015年2月4日発売

エキセドリンカプセル (ライオン)

3つの成分を配合したカプセルタイプの非ピリン系製剤

区分 指定第2類医薬品

成分 力 2カプセル中：

アセチルサリチル酸……………500mg
アセトアミノフェン……………300mg
無水カフェイン……………120mg

添加物 トウモロコシデンプン、ジメチルポリシロキサン、ラウリル硫酸Na、青色1号、酸化チタン、ゼラチン

効能 頭痛、月経痛(生理痛)、歯痛、咽喉痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、抜歯後の疼痛、関節痛、神経痛、ねんざ痛、骨折痛、外傷痛、耳痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。又、服用間隔は6時間以上おくこと

製剤 青色・白色の硬カプセル

包装・価格 20カプセル 1,100円

(製品写真007頁)

エルペインコーワ (興和)

生理痛専用薬

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 1錠中：

イブプロフェン……………150mg

ブチルスコポラミン臭化物……………10mg

添加物 乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、タルク、トリアセチン、酸化チタン、三酸化鉄、カルナウバロウ

効能 生理痛(主に、軟便を伴う下腹部の痛みがある場合)

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 ピンク色のフィルムコーティング錠

包装・価格 12錠 980円

その他 販売 興和新薬

キオフィーバ (桶屋製薬)

お子さまの発熱に

区分 第2類医薬品

成分 錠 1個(950mg)中：

アセトアミノフェン……………100mg

添加物 ハードファット

効能 小児の発熱時の一時的な解熱

用法・用量 6~12才1回1~2個、3~5才1回1個、1~2才1回1.2~1個。1日1回、肛門内に挿入。

製剤 白色の坐剤

包装・価格 10個 1,000円

グレランエース錠 (武田薬品工業)

頭痛・歯痛・生理痛に。非ピリン系解熱鎮痛剤

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 4錠中：

エテンザミド……………1,000mg

アセトアミノフェン……………600mg

プロモバレルリ尿素……………400mg

無水カフェイン……………52mg

ジベンゾイルチアミン(ビタミンB誘導体)…20mg

添加物 クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Ca水和物

効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけてかまわずに服用。服用間隔は6時間以上おくこと

製剤 白色の錠剤

包装・価格 12錠 600円・24錠 1,000円

グレラン・ビット (武田薬品工業)

頭痛・生理痛にはやく効く

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 6錠中：

イブプロフェン……………450mg

アセトアミノフェン……………195mg

添加物 トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース

効能 頭痛・月経痛(生理痛)・腰痛・肩こり痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)は1回2錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけてかまわずに服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色の錠剤

包装・価格 8錠 476円・24錠 1,029円・48錠 1,505円

ケロイチ
(日新薬品工業)

悪寒・発熱時の解熱、頭痛・
歯痛・神経痛の鎮痛に

区分 指定第2類医薬品
成分 散 2包(1.6g)中：
 アスピリン……………1.2g
 カフェイン水和物……………0.12g
添加物 トウモロコシデンプン、ケイヒ末、軽質無水ケイ酸
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おく
包装・価格 3包 300円

ケロリン
(内外薬品)

アセチルサリチル酸、ケイヒ
配合解熱鎮痛薬

区分 指定第2類医薬品
成分 散 1包中：
 アセチルサリチル酸……………600mg
 無水カフェイン……………60mg
 ケイヒ末……………60mg
添加物 バレイショデンプン
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おくこと
製剤 淡褐色の粉末剤
包装・価格 12包 700円・28包 1,300円・64包 2,500円

ケロリンA錠
(内外薬品)

アセチルサリチル酸、無水カ
フェイン、ケイヒ末配合

区分 指定第2類医薬品
成分 錠 4錠中：
 アセチルサリチル酸……………1,200mg
 無水カフェイン……………100mg
 ケイヒ末……………100mg

乾燥水酸化アルミニウムゲル……………200mg
添加物 カルボキシメチルセルロース、その他2成分
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おくこと
製剤 褐色の裸錠
包装・価格 16錠 630円・36錠 1,100円
その他 2014年10月8日発売

ケロリンBカプレット
(内外薬品)

イブプロフェン配合解熱鎮痛薬

区分 指定第2類医薬品
成分 錠 1錠中：
 イブプロフェン……………150mg
 アリルイソプロピルアセチル尿素……………60mg
 無水カフェイン……………80mg
添加物 D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと
製剤 白色のカプレット錠
包装・価格 16錠 1,100円・24錠 1,500円

ケロリンチュアブル
(内外薬品)

どこでも水なしで飲める、
チュアブル錠の解熱鎮痛薬

区分 指定第2類医薬品
成分 錠 3錠中：
 アセチルサリチル酸……………1,350mg
 アミノ酢酸……………900mg
添加物 バレイショデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、安息香酸ベンジル、エチルバニリン、デンプン部分加水分解物、バニリン、その他3成分
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて、かむか、口中で溶かして服用。服用間隔は4時間以上おくこと
製剤 白色のチュアブル錠
包装・価格 6錠 480円・12錠 780円

こどもパブロン坐薬
(大正製薬)

お子さまの急な発熱に／薬が
のめない時にも

区分 第2類医薬品
成分 坐 1個(1g)中：
 アセトアミノフェン……………100mg
添加物 ハードファット
効能 小児の発熱時の一時的な解熱
用法・用量 6～12才1～2個、3～5才1個、1～2才½～1個、1日1回、肛門内に挿入
製剤 白色紡すい形の肛門坐剤
包装・価格 10個 980円

こどもリングルサット
(佐藤製薬)

お子様の熱や痛みに。水なし
でのめ、サッと溶ける

区分 第2類医薬品
成分 錠 12錠中：
 アセトアミノフェン……………600mg
添加物 エリスリトール、D-マンニトール、ポビドン、サッカリンNa、三酸化鉄、タルク、香料(デンプン部分加水分解物、グリセリン、バニリンを含む)、その他2成分
効能 頭痛、歯痛、抜歯後の疼痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、骨折痛、ねんざ痛、月経痛(生理痛)、外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 11～14才1回4錠、7～10才1回3錠、5～6才1回2錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけ、かむか口中で溶かして服用。服用間隔は4時間以上おくこと
製品特有の注意 割れたり欠けたりすることがあるが、効果に変わりはない。割れたり欠けたりした分も含めて飲む
製剤 クリーム色の錠剤
包装・価格 24錠 950円

コリホン顆粒
(日新薬品工業)

肩こり痛、腰痛、神経痛などに優れた効果をあらわす顆粒剤

区分 第2類医薬品
成分 顆粒 2包(4g)中：
 地竜乾燥エキス……………260mg
 (原生薬換算量：2,000mg)
 シャクヤクエキス……………200mg
 (原生薬換算量：2,000mg)
 カンゾウ乾燥エキス……………400mg
 (原生薬換算量：2,000mg)
 アセトアミノフェン……………600mg
添加物 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ケイヒ油、ウイキョウ油
効能 肩こり痛・腰痛・神経痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包、11～14才 $\frac{2}{3}$ 包、7～10才 $\frac{1}{2}$ 包、3～6才 $\frac{1}{3}$ 包。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おく
製品特有の注意 生薬エキスを用いた製品のため、製品により色調や味が多少異なることがある
包装・価格 6包

コルゲンコーワ鎮痛解熱LX α
(興和)

かぜなどののどの痛み・発熱に速く効く

区分 第1類医薬品
成分 錠 1錠中：
 ロキソプロフェンナトリウム水和物・68.1mg
 (無水物として60mg)
 トラネキサム酸……………140.0mg
添加物 セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、二酸化ケイ素、酸化チタン、三酸化鉄、カルナウバロウ
効能 咽喉痛・頭痛・関節痛・筋肉痛・耳痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・外傷痛の鎮痛、発熱・悪寒時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日2回まで。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用(服用間隔は4時間以上おく)
製剤 ピンク色のフィルムコーティング錠

包装・価格 12錠 1,100円
その他 2015年7月1日発売
販売 興和新薬

コンジスイとんぷく
(丹平製薬)

頭痛・歯痛などに4種の成分を配合した頓用の鎮痛薬

区分 指定第2類医薬品
成分 顆粒 1包(1.3g)中：
 エテンザミド……………500mg
 アセトアミノフェン……………300mg
 プロモバレリル尿素……………180mg
 無水カフェイン……………80mg
添加物 サッカリンNa水和物、香料、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、乳糖水和物
効能 頭痛、歯痛、月経痛(生理痛)、神経痛、抜歯後の疼痛、肩こり痛、腰痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、筋肉痛、打撲痛、ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包、11～14才1回 $\frac{2}{3}$ 包、7～10才1回 $\frac{1}{2}$ 包。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと
製剤 白色の顆粒
包装・価格 8包 900円

(製品写真012頁)

コンドロイチンZS錠
(ゼリア新薬工業)

コンドロイチン製剤。関節痛・腰痛・神経痛・疲労回復に

区分 第3類医薬品
成分 錠 1錠中：
 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………260mg
添加物 ケイ酸Ca、無水ケイ酸、セルロース、アセスルファムK、ステアリン酸Mg、香料
効能 関節痛、神経痛、腰痛、五十肩、神経性難聴、音響外傷性難聴、疲労回復
用法・用量 1回2錠。1日3回服用
製剤 白色～微黄色の素錠
包装・価格 108錠 3,695円・180錠 5,600円・270錠 7,505円

サリドンA
(第一三共ヘルスケア)

イソプロピルアンチピリンを主成分とした鎮痛・解熱剤

区分 指定第2類医薬品
成分 錠 1錠中：
 イソプロピルアンチピリン……………150mg
 エテンザミド……………250mg
 カフェイン水和物……………50mg
添加物 トウモロコシデンプン、セルロース、タルク、ステアリン酸Mg
効能 頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・咽喉(いんこう)痛・耳痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。悪寒(おかん)・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、8～14才1回 $\frac{1}{2}$ 錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと
製剤 白いカプレット型の錠剤
包装・価格 10錠 780円・20錠 1,400円

サリドンWi
(第一三共ヘルスケア)

イソプロピルアンチピリン、イブプロフェンを配合

区分 第2類医薬品
成分 錠 1錠中：
 イソプロピルアンチピリン……………150mg
 イブプロフェン……………50mg
 無水カフェイン……………50mg
添加物 クロスCMC-Na、ヒプロメロース、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、タルク、乳糖
効能 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽頭痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おくこと
製剤 白色の錠剤
包装・価格 10錠 1,000円・20錠 1,700円

サロヒーネ
(日新薬品工業)

非ピリン系で頭痛・歯痛の鎮痛に

区分 指定第2類医薬品
成分 散 2包(2g)中：
 アセトアミノフェン……………600mg
 エテンザミド……………680mg
 アリルイソプロピルアセチル尿素…120mg
 無水カフェイン……………90mg
添加物 合成ケイ酸アルミニウム、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包、11～14才 $\frac{3}{4}$ 包、7～10才 $\frac{1}{2}$ 包、3～6才 $\frac{1}{4}$ 包、1～2才 $\frac{1}{4}$ 包。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おく
包装・価格 3包 300円

JPS熱さまし
(ジェーピーエス製薬)

地竜エキスを配合した感冒時の解熱薬

区分 第2類医薬品
成分 顆 3包(3.0g)中：
 地竜エキス散-N……………1.5g
添加物 バレイショデンプン、CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイヒ油、D-マンニトール、デキストリン、乳糖水和物
効能 感冒時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包、11～14才1回 $\frac{3}{4}$ 包、8～10才1回 $\frac{1}{2}$ 包、5～7才1回 $\frac{1}{4}$ 包、3～4才1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回服用
製剤 淡黄褐色～黄褐色の顆粒剤

歯痛頭痛ヒロリン
(廣貴堂)

はいた 神経痛 頭痛 生理痛

区分 指定第2類医薬品
成分 散 2包1.9g中：
 アスピリン……………1.2g
 プロモバレリル尿素……………0.4g
 カフェイン水和物……………0.2g
 ケイヒ末……………0.1g
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・のどの痛み・耳痛・関節痛・神経痛・腰

痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。
 悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おくこと
製剤 淡褐色の粉末剤
包装・価格 3包 300円

歯痛リングル
(佐藤製薬)

白色の甘味のある、のみやすい細粒の鎮痛剤

区分 指定第2類医薬品
成分 細 1包(1.5g)中：
 アスピリンアルミニウム……………1,000mg
 ブロムワレリル尿素……………100mg
 無水カフェイン……………50mg
添加物 D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、無水ケイ酸、香料(トコフェロールを含む)
効能 歯痛、抜歯後の疼痛の鎮痛、頭痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、骨折痛、ねんざ痛、月経痛(生理痛)、外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は、6時間以上おくこと
製剤 白色の細粒
包装・価格 9包 980円

小中学生用ノーシンピュア
(アラクス)

小中学生の生理痛・頭痛・熱に。小粒でのみやすい

区分 指定第2類医薬品
成分 錠 2錠中：
 アセトアミノフェン……………200mg
 アリルイソプロピルアセチル尿素…30mg
 無水カフェイン……………40mg
添加物 セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ、ヒプロメロース、酸化チタン
効能 月経痛(生理痛)、頭痛、腰痛、歯痛、咽喉痛、関節痛、筋肉痛、神経痛、肩こり痛、抜歯後の疼痛、打撲痛、耳痛、骨折痛、ねんざ痛、外傷痛の鎮痛。悪寒、発熱時の解熱
用法・用量 11～14才1回2錠、7～10才1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以

上おくこと
製剤 白色のフィルムコーティング錠
包装・価格 12錠 360円・24錠 680円

小児用バファリンC II
(ライオン)

アセトアミノフェンを主成分とした非アスピリン製剤

区分 第2類医薬品
成分 錠 1錠中：
 アセトアミノフェン……………33mg
添加物 D-マンニトール、セルロース、CMC、サッカリンNa、サッカリン、黄色5号、ゼラチン、ステアリン酸Mg、香料
効能 悪寒・発熱時の解熱。歯痛、頭痛、腰痛、筋肉痛、抜歯後の疼痛、打撲痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、神経痛、肩こり痛、骨折痛、ねんざ痛、月経痛(生理痛)、外傷痛の鎮痛
用法・用量 11～14才1回6錠、7～10才1回4錠、3～6才1回3錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと
製剤 淡橙色の錠剤
包装・価格 16錠 500円・32錠 910円・48錠 1,260円

小児用バファリンチュアブル
(ライオン)

水なしでのめるチュアブルタイプ
の解熱鎮痛薬

区分 第2類医薬品
成分 錠 1錠中：
 アセトアミノフェン……………50mg
添加物 セルロース、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸Na、トリアセチン、D-マンニトール、クロスポビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリン、アセスルファムカリウム、黄色5号、ステアリン酸Mg、香料
効能 悪寒・発熱時の解熱。歯痛、頭痛、抜歯後の疼痛、打撲痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、神経痛、肩こり痛、骨折痛、ねんざ痛、月経痛(生理痛)、外傷痛の鎮痛
用法・用量 3～6才2錠、7～10才3錠、11～14才4錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用間隔は4時間以上おき、かみくだくか、口の中で溶かして服用すること
製剤 淡橙色の錠剤
包装・価格 12錠 650円

新セデス錠

(塩野義製薬)

頭痛・発熱・生理痛に速く効いて 胃にソフト

区分 指定第2類医薬品

成分 錠1錠中：

エテンザミド……………200mg
アセトアミノフェン……………80mg
アリルイソプロピルアセチル尿素…30mg
無水カフェイン……………40mg

添加物 乳糖水和物, カルメロースカルシウム, クロスカルメロースナトリウム, ヒドロキシプロピルセルロース, ステアリン酸マグネシウム

効能 頭痛, 歯痛, 月経痛(生理痛), 神経痛, 腰痛, 外傷痛, 抜歯後の疼痛, 咽喉痛, 耳痛, 関節痛, 筋肉痛, 肩こり痛, 打撲痛, 骨折痛, ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 小児(7~14才)1回1錠。1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水またはぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色の錠剤

包装・価格 20錠 650円・40錠 1,200円・60錠 1,650円・80錠 1,900円

新パトシク錠

(日邦薬品工業)

2つの生薬にアセトアミノフェンとエテンザミドを配合

区分 指定第2類医薬品

成分 錠6錠中：

アセトアミノフェン……………450mg
エテンザミド……………750mg
カンゾウ粗エキス……………180mg
(原生薬換算量：900mg)

シャクヤク乾燥エキス……………129mg
(原生薬換算量：900mg)

チアミンジスルフィド……………18mg

添加物 乳糖, ヒドロキシプロピルセルロース, メタケイ酸アルミン酸Mg, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, マクロゴール, 酸化チタン

効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 次の1回量を1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて服用。成人(15才以上)1回2錠, 7~14才1回1錠

製剤 白色錠剤

包装・価格 20錠 800円・40錠 1,500円

その他 製造販売 日東薬品工業

スパロミンエース

(三宝製薬)

痛み・熱・生理痛《イブプロフェン配合》

区分 指定第2類医薬品

成分 錠1日量《6錠(1錠200mg)》中：

イブプロフェン……………450mg
アリルイソプロピルアセチル尿素…180mg
無水カフェイン……………240mg

添加物 トウモロコシデンプン, ヒドロキシプロピルセルロース, CMC-Ca, ステアリン酸Mg, メタケイ酸アルミン酸Mg, セルロース

効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと。成人(15才以上)1回2錠, 1日3回を限度とする

製剤 白色の錠剤

包装・価格 30錠 850円

セデスV

(塩野義製薬)

肩こり痛・腰痛・頭痛に

区分 指定第2類医薬品

成分 錠1錠中：

エテンザミド……………200mg
アセトアミノフェン……………80mg
アリルイソプロピルアセチル尿素…30mg
無水カフェイン……………40mg

ジセチアミン塩酸塩水和物(ビタミンB₁誘導体)……………4mg

添加物 カルメロースカルシウム, 結晶セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, ステアリン酸マグネシウム

効能 頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・肩こり痛・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 小児(7~14才)1回1錠。1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水またはぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色の錠剤

包装・価格 10錠 400円・30錠 900円

セデスキュア

(塩野義製薬)

イブプロフェン配合, 生理痛・のどの痛み・頭痛に

区分 指定第2類医薬品

成分 錠1錠中：

イブプロフェン……………75mg
アリルイソプロピルアセチル尿素…30mg
無水カフェイン……………40mg

添加物 結晶セルロース, トウモロコシデンプン, 軽質無水ケイ酸, アルファー化デンプン, 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース, タルク, ステアリン酸マグネシウム, ヒプロメロース, マクロゴール6000, 酸化チタン, カルナウバロウ

効能 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・腰痛・肩こり痛・関節痛・神経痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水またはぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 10錠 280円・30錠 520円

セデス・ハイ

(塩野義製薬)

イソプロビルアンチピリン配合。頭痛・発熱の痛みにも、早く良く効く

区分 指定第2類医薬品

成分 錠1錠中：

イソプロビルアンチピリン……………75mg
アセトアミノフェン……………125mg
アリルイソプロピルアセチル尿素…30mg
無水カフェイン……………25mg

添加物 カルメロースカルシウム, クロスカルメロースナトリウム, ポビドン, ステアリン酸マグネシウム, 結晶セルロース, トウモロコシデンプン, 乳糖水和物, ヒドロキシプロピルセルロース

効能 頭痛, 月経痛(生理痛), 歯痛, 神経痛, 腰痛, 外傷痛, 抜歯後の疼痛, 咽喉痛, 耳痛, 関節痛, 筋肉痛, 肩こり痛, 打撲痛, 骨折痛, ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日3回を限度とし, なるべく空腹時をさけて水またはぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色の錠剤

包装・価格 10錠 720円・20錠 1,300円・40錠 2,200円

症状別索引

1. 症状別索引では、各症状から薬効群を検索することができます。これらの症状は、収載されている製品の効能をもとにしていますが、読み替えているものもあります。
2. 索引中の各症状(各効能)は、薬効群中のすべての製品に当てはまるとは限りません。

ア

あかぎれ

- しもやけ・あかぎれ用薬・432
皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)……………448
- ◎紫雲膏……………642
- しもやけ・あかぎれ用薬(部外品)……………728

赤鼻

- ビタミンB₂主薬製剤……………496
- ◎清上防風湯……………652

足のむくみ

- 生薬製剤……………686

あせも

- 外用湿疹・皮膚炎用薬……………405
- かゆみ・虫さされ用薬……………424
- ◎紫雲膏……………642
- ◎消風散……………651

あせり

- 催眠鎮静薬……………67

アレルギー性鼻炎

- ☞鼻炎

イ

胃アトニー

- ☞胃腸虚弱

胃炎

- 複合胃腸薬……………153
- ◎黄连解毒湯……………616
- ◎四逆散……………643
- ◎小柴胡湯……………648
- ◎小半夏加茯苓湯……………651
- ◎大柴胡湯……………655
- ◎六君子湯……………681

胃下垂

- ◎半夏瀉心湯……………670
- ◎六君子湯……………681

息切れ

- 強心薬……………115
- 女性用保健薬……………469
- ◎九味檳榔湯……………628
- ◎柴胡桂枝乾姜湯……………639
- ◎苓桂朮甘湯……………683
- ◎連珠飲……………684

育毛

- 発毛・養毛薬……………458

胃酸過多

- 制酸薬……………144
- 複合胃腸薬……………153
- 胃腸鎮痛鎮痙薬……………194

胃弱

- 健胃薬……………148
- 複合胃腸薬……………153
- ◎半夏瀉心湯……………670
- 健胃薬(部外品)……………723

胃重

- 制酸薬……………144
- 複合胃腸薬……………153

胃腸炎

- 健胃薬……………148
- 複合胃腸薬……………153
- ◎安中散……………612
- ◎安中散加茯苓……………612
- ◎胃苓湯……………614
- ◎藿香正気散……………618
- ◎葛根黄連黄芩湯……………618
- ◎甘草瀉心湯……………626
- ◎九味檳榔湯……………628
- ◎五積散……………635
- ◎五苓散……………636
- ◎柴胡桂枝湯……………640
- ◎小建中湯……………647
- ◎真武湯……………652
- ◎人参湯(理中丸)……………664
- ◎半夏瀉心湯……………670
- ◎平胃散……………672

胃腸虚弱

- 小児鎮静薬(小児五疳薬)……………81
- 強心薬……………115
- 生薬主薬保健薬……………552
- 薬用酒……………557
- ◎安中散……………612
- ◎安中散加茯苓……………612
- ◎小柴胡湯……………648
- ◎真武湯……………652
- ◎人参湯(理中丸)……………664
- ◎六君子湯……………681

胃腸障害

- ビタミン含有保健薬(液剤)……………515
- ビタミン含有保健薬(固形剤)……………541
- その他の滋養強壮保健薬……………562
- 健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの(部外品)……………725

胃痛

- 制酸薬……………144
- H₂ブロッカー……………147
- 複合胃腸薬……………153
- 胃腸鎮痛鎮痙薬……………194
- ◎四逆散……………643

- ◎小柴胡湯……………648
- ◎人参湯(理中丸)……………664
- ◎六君子湯……………681

胃のむかつき

- ☞はきけ

胃部不快感

- 制酸薬……………144
- 複合胃腸薬……………153
- 健胃清涼剤(部外品)……………722

胃部膨満感

- 制酸薬……………144
- 健胃薬……………148
- 複合胃腸薬……………153
- 整腸薬……………174
- 健胃薬(部外品)……………723
- 消化薬(部外品)……………723
- 健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの(部外品)……………725

いぼ

- うおのめ・たこ・いぼ用薬……………456
- ◎麻杏薏甘湯……………680

いぼ痔

- ◎乙字湯……………617
- ◎紫雲膏……………642

胃もたれ

- ☞もたれ

意欲減退

- 催眠鎮静薬……………67

いらいら・いらいら感

- 鎮静薬……………67
- 催眠鎮静薬……………67

いんきんたむし

- 水虫・たむし用薬……………439

咽喉痛

- ☞のどの痛み

咽頭炎

- 内服口内炎用薬……………322
- ◎麦門冬湯……………665

ウ

うおのめ

- うおのめ・たこ・いぼ用薬……………456
- ◎紫雲膏……………642

うがい

- うがい薬……………111
- 含嗽薬(部外品)……………717

薄毛

- 発毛・養毛薬……………458

うちみ

- ☞打撲

エ

栄養障害

- ビタミン含有保健薬(液剤)……………515
- ビタミン含有保健薬(固形剤)……………541
- その他の滋養強壮保健薬……………562
- ビタミン含有保健剤(部外品)……………729
- ビタミンを含有する保健薬(部外品)……………739

栄養補給

- ビタミン含有保健薬(液剤)……………515
- ビタミン含有保健薬(固形剤)……………541
- 生薬主薬保健薬……………552
- その他の滋養強壮保健薬……………562
- 健胃薬(部外品)……………723
- 健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの(部外品)……………725
- ビタミン含有保健剤(部外品)……………729
- ビタミンを含有する保健薬(部外品)……………739

円形脱毛症

- 発毛・養毛薬……………458

オ

嘔気

- ☞はきけ

嘔吐

- 制酸薬……………144
- 健胃薬……………148
- 複合胃腸薬……………153
- ◎小半夏加茯苓湯……………651
- ◎人参湯(理中丸)……………664
- ◎六君子湯……………681
- 健胃薬(部外品)……………723
- 健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの(部外品)……………725

悪寒

- 解熱鎮痛薬……………10
- かぜ薬……………34

50音順索引

〔要指薬〕：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，③：第2類医薬品，④：第3類医薬品，〔部外品〕：指定医薬部外品を表します。
 製品名冒頭に接頭語や形容詞が付されている場合は、それらを除いた状態でも引けるようにしてあります。
 例：新エスタック「W」→【免】に「エスタック「W」〔新〕」，【し】に「新エスタック「W」」

【あ】

- アイガン②……………245
 愛眼E②……………245
 アイガンビューティ②……………245
 アイスラブゲル③……………391
 アイスラブスプレー③……………391
 アイビットV③……………245
 アイビットゴールド③……………245
 アイビット目薬クール②……………245
 アイフリーコーワAL①……………267
 アイボンAL d③……………277
 アイボンc③……………277
 アイボンw③……………277, ⑤026
 アイボンうるおいケア③……………277
 アイボンクールc③……………278
 アイボントロリー目薬③……………246
 アイボントロリー目薬ドライアイ③……………272
 アイボンマイルドc③……………278
 アイラート40③……………246
 アイラートAG②……………267
 アイリス③……………246
 アイリス40③……………246
 アイリス50③……………246
 アイリス50クール③……………246
 アイリスAGガード②……………267
 アイリスAGクール②……………247
 アイリスAGユニット②……………247
 アイリスCL-Iネオ③……………272, ⑤017
 アイリスRinc②……………247
 アイリスガードP②……………247
 アイリス〔こども〕③……………249
 アイリス使いきり〔抗菌〕②……………271, ⑤017
 アイリスネオ〈クール〉③……………247
 アイリスネオ〈ソフト〉③……………247
 アイソAD軟膏EX②……………405
 アイソゴールド錠③……………508
 アイソゴールド内服液③……………492
 赤玉はら薬S〔廣貴堂〕②……………183
 アクチビア軟膏①……………461
 アクティL②……………472
 アクティ内服液〔若甦〕③……………519
 アクティビオ③……………174
 アクテージAN錠③……………492, ⑤021
 アクテージSN錠③……………508
 アクネージア ニキビ薬②……………367
 アクリガーゼ〔ケンエー・〕〔部外品〕……………727
 アクリノール液P〔ケンエー〕〔部外品〕……………727
 アクロミンカプセルA②……………183
 浅田飴②……………91, ⑤002
 浅田飴AZうがい薬③……………111
 浅田飴AZのどスプレーS③……………318
 アサダアメガードドロップAC〔部外品〕……………718, ⑤002
 アサダアメガードドロップAP〔部外品〕……………718
 アサダアメガードドロップBM〔部外品〕……………718
 アサダアメガードドロップGF〔部外品〕……………719
 アサダアメガードドロップGR〔部外品〕……………719
 浅田飴子供せきどめドロップG②……………91
 浅田飴子供せきどめドロップS②……………91
 浅田飴せきどめ②……………91
 浅田飴せきどめCL②……………91, ⑤002
 浅田飴せきどめGA②……………91
 浅田飴せきどめLE②……………92
 浅田飴せきどめOG②……………92
 浅田飴せきどめSD②……………92
 浅田飴のどクールスプレー③……………318
 アシノンZ①……………147
 アシノンZ胃腸内服液①……………147
 アシノンZ錠①……………147, ⑤012
 アスコロン②……………92
 アスacol2000③……………499
 アスacolビン酸K③……………499
 アスターG軟膏②……………439
 アスター軟膏②……………439
 アストフィリンS②……………92
 アスバラMAX〔部外品〕……………739
 アスパライトロイヤルE③……………248
 アスパラドリンクα〔部外品〕……………739, ⑤005
 アスパラメガ③……………492
 アスバラ目薬Lプラス②……………248
 アスバラ目薬クールICプラス②……………248
 アスバラ目薬モイストCL③……………272
 アスピタン〈デルマ〉③……………496
 アズレアうがい液③……………111
 アセス③……………329, ⑤009
 アセスE③……………329
 アセスL③……………329
 アセス液③……………329
 アセスジュニア③……………330
 アセスメディクリン③……………330, ⑤009
 アセモア②……………405
 アセモアa②……………405
 アーチスキン〔部外品〕……………727
 アッチQQ②……………357
 アットノン②……………462
 アットノンc②……………462
 アドレニンエース錠②……………92
 アドレニンエースシロップ②……………92
 穴あきサロンパスA^e③……………375
 アニベールエース液②……………439
 アニベールエースクリーム②……………439
 アニマリンL錠③……………541
 アニマリンM③……………515
 アネトン アルメディ鼻炎錠②……………293, ⑤022
 アネトンせき止めZ液②……………93, ⑤022
 アネトンせき止めZ液 分包②……………93
 アネトンせき止めZ錠②……………93
 アネトンせき止め顆粒①……………93
 アネロン「キャップ」②……………308
 アネロン「ニスキャップ」②……………308
 アバロンS②……………153
 アビトベール②……………642
 アフタッチA②……………322, ⑤009
 アポステイー EC+B③……………506
 アポステイークリーム②……………367, ⑤013
 アポステイーローション③……………357, ⑤013
 アムティバップ②……………375
 アラクス鼻炎スティック②……………293
 アラセナS①……………461, ⑤011
 アラセナSクリーム①……………461
 アリナファイトエース-50③……………492
 アリナミン7〔部外品〕……………729, ⑤025
 アリナミンA③……………492, ⑤021
 アリナミンA50③……………493
 アリナミンEXゴールド③……………509, ⑤021
 アリナミンEXプラス③……………509, ⑤021
 アリナミンR〔部外品〕……………729
 アリナミンRオフ〔部外品〕……………729, ⑤025
 アリナミンV〔部外品〕……………729, ⑤025
 アリナミンV&V NEW〔部外品〕……………729
 アリナミンV&Vロイヤル〔部外品〕……………729
 アリナミン錠〔部外品〕……………730
 アリナミンゼロ7〔部外品〕……………730, ⑤025
 アルガード鼻炎クールアップEX②……………293
 アルガード鼻炎クールスプレーa②……………289
 アルガード目すっきり洗眼薬α③……………278
 アルクラック内服液②……………686
 アルフェ エフイーアップ②……………515
 アルフェネオ〔部外品〕……………730, ⑤014
 アルフリー新目薬〔サンテ〕②……………269
 アルペンFこどもかぜシロップ②……………34
 アルペンSこどもかぜシロップ②……………34
 アルペンSこどもせきどめシロップ②……………93
 アルペンSこども鼻炎シロップ②……………293
 アルペンうがい〔部外品〕……………717
 アルペンこどもかぜ薬J細粒②……………34
 アルペンこどもかぜ薬K細粒②……………34
 アルメディ鼻炎錠〔アネトン〕②……………293, ⑤022
 アレギサル鼻炎②……………293
 アレギトール②……………231
 アレグラFX①……………293
 アレジオン10②……………294
 アレジオン20②……………294, ⑤003
 アレルギールSK②……………405
 アレルギールクリーム②……………405
 アレルギールジェル②……………405
 アレルギール錠②……………231
 アロエ製薬便秘錠②……………212
 アロエ便秘薬③……………212
 アロパノール②……………686

会社名別索引

〔要指〕：要指導医薬品，①：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，②：第2類医薬品，③：第3類医薬品，〔部外品〕：指定医薬部外品を表します。

浅田館

- 浅田館(鎮咳去痰薬)② ……91, ⑤002
- 浅田館AZうがい薬(うがい薬)③ ……111
- 浅田館AZのドスプレーS(口腔内殺菌消毒薬)③ ……318
- アサダアメガードドロップAC(口腔咽喉薬)〔部外品〕 ……718, ⑤002
- アサダアメガードドロップAP(口腔咽喉薬)〔部外品〕 ……718
- アサダアメガードドロップBM(口腔咽喉薬)〔部外品〕 ……718
- アサダアメガードドロップGF(口腔咽喉薬)〔部外品〕 ……719
- アサダアメガードドロップGR(口腔咽喉薬)〔部外品〕 ……719
- 浅田館子供せきどめドロップG(鎮咳去痰薬)② ……91
- 浅田館子供せきどめドロップS(鎮咳去痰薬)② ……91
- 浅田館せきどめ(鎮咳去痰薬)② ……91
- 浅田館せきどめCL(鎮咳去痰薬)② ……91, ⑤002
- 浅田館せきどめGA(鎮咳去痰薬)② ……91
- 浅田館せきどめLE(鎮咳去痰薬)② ……92
- 浅田館せきどめOG(鎮咳去痰薬)② ……92
- 浅田館せきどめSD(鎮咳去痰薬)② ……92
- 浅田館のどクールスプレー(口腔内殺菌消毒薬)③ ……318
- 去痰CB錠(鎮咳去痰薬)② ……94
- 固形浅田館クールS(鎮咳去痰薬)② ……95, ⑤002
- 固形浅田館ニッキS(鎮咳去痰薬)② ……95
- 固形浅田館パッションS(鎮咳去痰薬)② 95
- スリムノール(高コレステロール低下薬)③ ……120
- トラベロップQQG(乗物酔い薬)② ……311
- トラベロップQQS(乗物酔い薬)② ……311
- ハルナー(睡眠改善薬)② ……72
- ピエロップQQ(鼻炎用内服薬)② ……299
- ルルのど館DXG(のど清涼剤)〔部外品〕 ……717
- 〔要指〕ルルのど館DXグレープ(のど清涼剤)〔部外品〕 ……717
- ルルのど館OR(のど清涼剤)〔部外品〕 ……717
- 〔要指〕ルルのど館オレンジ味(のど清涼剤)〔部外品〕 ……717

アサヒフードアンドヘルスケア

- エビオス錠(健胃薬)〔部外品〕 ……723
- 新ラクトンA(整腸薬)〔部外品〕 ……724

あすか製薬

- イノセアワンブロック(H₂ブロッカー)① ……147

天藤製薬

- 内服ボラギノールEP(痔疾用内服薬)② 349
- ボラギノールA坐剤(痔疾用坐薬)② ……346
- ボラギノールA注入軟膏(痔疾用軟膏)② ……348
- ボラギノールA軟膏(痔疾用軟膏)② ……348
- ボラギノールM坐剤(痔疾用坐薬)② ……346
- ボラギノールM軟膏(痔疾用軟膏)② ……348

アラクス

- アラクス鼻炎スティック(鼻炎用内服薬)② ……293
- カイベールC(便秘薬)② ……213
- カイベールAロエプラス(便秘薬)② ……213
- カフェクール200(眠気防止薬)③ ……77
- 小中学生用ノーシンピュア(解熱鎮痛薬)② ……14
- しんせんとう「五積散」(五積散)② ……635
- セイドールA(止瀉薬(下痢止め))② ……184
- セイドールストップ(止瀉薬(下痢止め))② ……184
- チェックワン(妊娠検査薬)② ……698
- チェックワンデジタル(妊娠検査薬)② 698
- ノーシン(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシンA1頭痛薬(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシンエフ200(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシン「細粒」(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシン錠(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシンピュア(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシンホワイト〈細粒〉(解熱鎮痛薬)② ……18
- ノーシンホワイト錠(解熱鎮痛薬)② ……19
- ハイタミン錠(解熱鎮痛薬)② ……19

アルフレッサ ファーマ

- 紫雲膏チューブ(紫雲膏)② ……643
- シンプトップ(高コレステロール低下薬)③ ……120
- ネオ・シーダー(鎮咳去痰薬)② ……101
- リリス総合感冒薬(かぜ薬)② ……61

池田模範堂

- 液体ムヒS2a(かゆみ・虫さされ用薬)② 424
- 液体ムヒアルファEX(かゆみ・虫さされ用薬)② ……424
- 液体ムヒベビー(かゆみ・虫さされ用薬)③ ……425
- ケアレケア(かゆみ・虫さされ用薬)③ ……425
- こどもアイスーパー(一般点眼薬)③ ……249
- デリケア(外用湿疹・皮膚炎用薬)③ ……411
- デリケアエムズ(外用湿疹・皮膚炎用薬)③ ……412
- テレスHiクリームS(外用湿疹・皮膚炎用薬)② ……412

- テレスHi軟膏S(外用湿疹・皮膚炎用薬)② ……412
- テレスハイクリーム(外用湿疹・皮膚炎用薬)② ……412
- テレスハイ軟膏(外用湿疹・皮膚炎用薬)② ……412
- テレスハイローション(外用湿疹・皮膚炎用薬)② ……412
- ヒビケア(しもやけ・あかぎれ用薬)③ ……432
- ヒビケアFT(しもやけ・あかぎれ用薬)③ ……432
- ポケムヒS(かゆみ・虫さされ用薬)③ ……427
- ムヒAZ錠(内服アレルギー用薬)② ……232
- ムヒS(かゆみ・虫さされ用薬)③ ……427
- ムヒアルファEX(かゆみ・虫さされ用薬)② ……428
- ムヒアルファSII(かゆみ・虫さされ用薬)② ……428
- ムヒエイチデイ(かゆみ・虫さされ用薬)② ……428
- ムヒソフトGX(外用湿疹・皮膚炎用薬)③ ……415
- ムヒソフトGX乳状液(外用湿疹・皮膚炎用薬)③ ……416
- ムヒのきず液(外用殺菌消毒薬)③ ……360
- ムヒのこどもかぜ顆粒(かぜ薬)② ……60
- ムヒのこどもかぜシロップPa(かぜ薬)② ……60
- ムヒのこどもかぜシロップSa(かぜ薬)② ……61
- ムヒのこども解熱鎮痛顆粒(解熱鎮痛薬)② ……21
- ムヒのこどもせきどめシロップS(鎮咳去痰薬)② ……105
- ムヒのこども鼻炎シロップS(鼻炎用内服薬)② ……301
- ムヒの虫よけムシペールα(虫よけ薬)② ……695
- ムヒの虫よけムシペールPS(虫よけ薬)② ……696
- ムヒパッチA(かゆみ・虫さされ用薬)③ 428
- ムヒ・ベビー(外用湿疹・皮膚炎用薬)③ 416

イチジク製薬

- イチジク洗腸10(洗腸薬)② ……204
- イチジク洗腸20(洗腸薬)② ……204
- イチジク洗腸30(洗腸薬)② ……204
- イチジク洗腸30E(洗腸薬)② ……204
- イチジク洗腸40(洗腸薬)② ……204
- イチジク洗腸40E(洗腸薬)② ……204
- イチジク洗腸ジャバラ(洗腸薬)② ……204
- リセッチ(洗腸薬)② ……205